

Skala nasilenia działań niepożądanych wg WHO					
	Stopień 0	Stopień 1	Stopień 2	Stopień 3	Stopień 4
Rytm serca	prawidłowy	tachykardia zatokowa spoczynkowa $\geq 110/\text{min.}$	nadkomorowe skurcze dodatkowe	skurcze dodatkowe komorowe wielosłrodkowe	częstoskurcz komorowy
Wydolność serca	zachowana	niewielkie odchylenia w badaniu przedmiotowym, bez objawów klinicznych	przemijająca niewydolność nie wymagająca leczenia	niewydolność odpowiadająca na leczenie	niewydolność oporna na leczenie
Zapalenie osierdzia	nieobecne	wysięk bezobjawowy	wysięk objawowy, drenaż niekonieczny	tamponada, konieczny drenaż	tamponada, konieczna operacja
Wydolność oddechowa	prawidłowa	niewielkie objawy	duszność wysiłkowa	duszność spoczynkowa	konieczne leżenie
Gorączka polekowa	nieobecna	$< 38 \text{ st C}$	$38-40 \text{ st C}$	$> 40 \text{ st C}$	gorączka z hipotonią
Odczyny alergiczne	nieobecne	obrzęki obwodowe	skurcz oskrzeli	skurcz oskrzeli, wymagane leczenie doustne	wstrząs anafilaktyczny leczenie pozajelitowe
Owłosienie głowy	prawidłowe	niewielka utrata włosów	nasilone łysienie	wyłysienie odwracalne	wyłysienie całkowite nieodwracalne
Skóra	Bez zmian patologicznych		suche złuszczenie, świąd, pęcherze		zapalenie złuszczone, martwica, wymaga leczenia chirurgicznego
Zakażenia	nieobecne	lekkie	średnie	ciężkie	ciężkie z hipotonią
Morfologia krwi					
hemoglobina g/100ml	$\geq 11,0$	9,5-10,9	8,0-9,4	6,5-7,9	$< 6,5$
leukocyty 1000/mm ²	$\geq 4,0$	3,0-3,9	2,0-2,9	1,0-1,9	$< 1,0$
granulocyty 1000/mm ²	$\geq 2,0$	1,5-1,9	1,0-1,4	0,5-0,9	$< 0,5$
płytki 1000/ mm ²	$\geq 100,0$	75,0-99,0	50,0-74,0	25,0-49,0	$< 25,0$
krwawienie	nieobecne	wybroczyny	niewielka utrata krwi	znaczna utrata krwi	krwotok
Przewód pokarmowy					
nudność/wymioty	nieobecne	nudności	wymioty przemijające	wymioty wymagające leczenia	nieustanne wymioty
biegunka	nieobecna	przebiegowa; < 2 dni	> 2 dni	wzmaga leczenia	biegunka krwotoczna, odwodnienie
zaparcia	nieobecna	łagodne	umiarkowane	silne, atonia jelit	atonia jelit, wymioty
śliny jamy ustnej	prawidłowe	dyskomfort, rumień	rumień, owrzodzenia, wymagane pokarmy stałe	owrzodzenia, wymagana dieta płynna	odżywianie doustne nie jest możliwe
bilirubina	$< 1,25 * N$	$1,26-2,9 * N$	$2,6-5,0 * N$	$5,1-10,0 * N$	$> 10,1 * N$
Bóle wywołane leczeniem	nieobecne	niewielkie	średnio nasilone	silne, atonia jelit	trudne do zniesienia
Wydolność nerek					
mocznik	$< 1,25 * N$	$1,26-2,5 * N$	$2,6-5,0 * N$	$5,1 - 10,0 * N$	$> 10,1 * N$
kreatynina	$< 1,6 * N$	$1,6 - 3,25 * N$	$3,26 - 6,5 * N$	powyżej $6,5 * N$	
białkomocz	nieobecny	$< 0,3 \text{ g\%}$	$0,3 - 1 \text{ g\%}$	$1,1 - 10 \text{ g\%}$	zespół nerczycowy
krwiomocz	nieobecny	mikroskopowy	nasilony	nasilony, obecne skrzepy	nefropatia
Układ nerwowy					
świadość	pełna	przemijająca senność	senność $> 50\%$ czasu	senność $< 50\%$ czasu aktywności	śpiączka aktywności
stan nerwów obwodowych	odrzuchy prawidłowe	parastezje, osłabienie odruchów ścięgnistych	silne parestezje, lub/i osłabienie ogólne	bardzo silne parestezje, lub/i znaczne osłabienie motoryki	porażenia