

Zdolny do normalnej aktywności i pracy	100	Normalny - bez dolegliwości, bez objawów choroby
Nie wymaga specjalnej opieki	90	Zdolny do normalnej aktywności, nieznaczne objawy choroby
	80	Wykoiuje normalne działania z wysiłkiem, niektóre objawy choroby
Niezdolny do pracy Zdolny do życia w domu i zaspokajania większości osobistych potrzeb	70	Zdolny do zaspokajania potrzeb osobistych Nie jest zdolny do normalnych czynności i lub aktywnej pracy
	60	Okresowo wymaga pomocy ale zaspokaja większość osobistych potrzeb
	50	Wymaga codziennej znacznej pomocy i częstych porad lekarskich
Niezdolny do zaspokajania potrzeb osobistych	40	Upośledzony; wymaga specjalnej opieki i pomocy
Wymaga hospitalizacji lub podobnej formy opieki	30	Znacznie upośledzony, wskazana hospitalizacja, ale
	20	Ciężko chory, hospitalizacja konieczna, konieczne leczenie podtrzymujące
	10	Umierający, groźne procesy szybko narastają

Stan sprawności wg WHO	
0	Normalna aktywność, nie wymaga opieki
1	Umiarkowanie zmniejszona aktywność i wydolność do pracy, podczas dnia nie leży w łóżku. Objawy choroby mogą być leczone ambulatoryjnie
2	Nie jest zdolny do pracy, częściowo zaspokaja potrzeby osobiste, wzrasta potrzeba opieki, a pomoc jest konieczna, przebywa w łóżku mniej niż połowę dnia
3	Nie może zaspokoić osobistych potrzeb, wymaga stałej opieki lub hospitalizacji, szybko narastają dolegliwości, przebywa w łóżku dłużej niż połowę dnia
4	Całkowicie uzależniony (obłożnie chory), stale przebywa w łóżku